

# Productinformatie

NORLAC GmbH  
 Industriestr. 27  
 27404 Zeven  
 GERMANY  
 Tel.: + 49 (0)4281 / 72-57347

		NORMI FORMIC zuur toevoeging		
<b>Analytische bestanddelen:</b>				
Ruw eiwit	%		1,6	
Ruw vet	%		0,1	
Ruwe as	%		6,0	
Ruwe celstof	%		0,1	
Fosfor	%		0,05	
Natrium	%		0,03	
VEM	per kg		1058	
<b>Mineralen boekhouding:</b>				
N	%		0,3	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%		0,1	
<b>Toevoegingsmiddelen per kg:</b>				
<b>Technologische Toevoegingsmiddelen:</b>				
Mierenzuur uit calciumformiaat	1a238		x	
Citroenzuur	1a330		x	
Propionzuur uit calciumpropionaat	1a282		x	
<b>Samenstelling:</b>				
Dextrose	%		75,0	
Magere melkpoeder	%		9,0	
<b>Houdbaarheid:</b>				
	maanden		12	
<b>Verpakking:</b>				
			20 kg 3-laags papieren zak met PE inliner	
<b>Gebruik:</b>				
Voedingsinstructie: Dit voedingssupplement wordt gebruikt om de melk aan te zuren. Doserings: 10 g/l melk				
Aanbevolen gebruik: NORMI FORMIC is een toevoeging om melk aan te zuren. Te gebruiken voor Biest melk, melkvervangers en volle melk.				
			<b>Biest &amp; volle melk</b>	<b>Rantsoenvoeding</b>
				<b>Vorraadvoeding</b>
			<b>pH waarde 5,6</b>	<b>pH waarde 5,0</b>
	<b>Mengtemperatuur</b>	Vanaf 2e voerbeurt		
		30 °C	30-35 °C	15-25 °C
	<b>Doserings</b>	10 g/l	10 g/l	20 g/l
Bij te hoge mengtemperaturen zullen de melkeiwitten gaan vlokken. Nogmaals roeren zorgt voor een homogeen product. Verlaag indien nodig de mengtemperatuur. Een overdosering met NORMI FORMIC kan de acceptatie verminderen en kan de melk te veel laten vlokken.				